

裏面もご覧ください

ナガチャコガネ      フォース粒剤      9kg/10a      7日  
成虫飛来期(6月上旬)      散布後土壌混和

## 【水稻】

### 磷酸・加里の補給

田植後30日頃 茎を太く・・・PKマグ 2袋

出穂前33日頃 穂形成期・・・苦土燐肥 2袋

### イモチ・白葉枯れ・靱がれ細菌・ウンカ・メイチュウ・コブノメイガ

田植後45日頃～出穂3週間前 **パダンバッサオリゼメート粒剤 3kg**

### モンガレ病

田植後40日頃～収穫30日前 **リンバー粒剤 3kg**

イモチ病が発生したら「**オリブライト粒剤**」1kgをご使用下さい。(治療効果大)

### ノビエ、キシユウスズメノヒエ

**クリンチャー 1kg** (粒) 10a/1.5kg 水を張って散粒処理

収穫40日前まで ノビエ3～4葉期まで

**クリンチャーEW** (茎葉散布剤) 10a/100cc を25～100ℓに希釈

収穫30日前まで ノビエ5葉期まで 展着剤加用 落水又は湛水散布

**クリンチャーバスマE** (茎葉散布剤) 10a/1000cc を70～100ℓに希釈

収穫50日前まで 広葉雑草及びノビエ5葉期まで

展着剤は加用しない 落水後散布

### **多発生注意** **イネアオムシ(フタオビコヤガ)**

窒素施用量が多く、イネの生育が軟弱な圃場で多発する傾向があります。

幼虫は大きくなると葉を縁から暴食し、止葉を食害された場合は減収に繋がります。

キラップジョーカーF      ダントツ      アルバリンなど

## 水の宅配便 好評です

1週間無料トライアルキャンペーン実施中！

3ガロンボトル1本と専用サーバーを1週間無料でお試しいただけます。

配達・設置もちろん無料です。お気軽にお申し込みください。

お申し込みの詳しい内容は下記フリーダイヤル、もしくはWebにて

お問い合わせください。

**「スーパーバナジウム富士」はバナジウム含有の100%天然水です**

(株)河原崎商事

0120-28-2226

<http://www.kawarasaki.co.jp>